



T.Stanes & Company Limited

8/23-24, Race Course Road, Coimbatore - 641 018

TAMILNADU - INDIA

Ph. 0422-2221514, Fax : 0422-2220432

website : www.t-stanes.com



PRODUCT CATALOGUE



सिम्बीयॉन एस्

(सल्फर विरघळवणारे जिवाणू)



● सिम्बीयॉन एस् मधील जिवाणू थायोबॅसिलस थायोक्सीडन्स हे जमिनीतील स्थिर सल्फर विद्राव्य करून पिकांना उपलब्ध करून द्यावयाचे काम करतात. (सल्फेट फॉर्म) या प्रक्रियेला ऑक्सीडेशन प्रोसेस म्हणतात. $2S + 3O_2 + H_2O \rightarrow 2H_2SO_4$

- या जिवाणुमुळे जमिनीचा जास्त पी.एच कमी करण्यास मदत होते.
- सिम्बीयॉन एस् मुळे पिकांच्या फळांची गोडी, रंग येण्यास मदत होते.

प्रमाण : १ ते १.५ लीटर / एकर

स्टेनोह्युम (ह्युमिक ॲसिड)



- स्टेनोह्युम हे नैसर्गिक ह्युमिक ॲसिड पासून बनलेले जमीन **भुसुधारक** आहे.
- स्टेनोह्युममध्ये पोटॅशियम ह्युमेट, ह्युमिक ॲसिड आणि उपयुक्त ट्रेस इलामेन्ट आहेत.
- जमिनीचा पोत सुधारण्याकरिता स्टेनोह्युम उपयुक्त आहे.
- हे पिकांच्या इन्झाईमला क्रियाशील करून पिकांच्या वाढीस चालना देते.
- जमिनीतील सूक्ष्म जिवाणूंची संख्या वाढण्यास मदत करते.

प्रमाण : जमिनीतून : ५ किलो/एकर


फवारणी : २.५ ते ३ मिली/लीटर

मायक्रोफूड (मायक्रोन्यूट्रीयंट)



- स्टेन्स मायक्रोफूड म्हणजेच निम पावडरयुक्त नत्र, स्फुरद, पालाश आणि उत्प्रेरक यांचा समावेश असणारे एकमेव उत्पादन.
- स्टेन्स मायक्रोफूड म्हणजेच उत्तम दर्जाचे सूक्ष्म मूलद्रव्याचे समतोल प्रमाण होय.
- मायक्रोफूडमुळे पिकांची, फळांची जलद, एकसारखी, निरोगी, जोमदार वाढ तसेच भरघोस व दर्जेदार उत्पादन.
- मायक्रोफूडमुळे जमिनीचा पोत सुधारतो.

प्रमाण : द्राक्ष, डाळिंब - २० किलो/एकर, आंबा - ५०० ग्रॅम ते १ किलो/प्राति झाड, फवारणी - ५०० ग्रॅम २०० लीटर पाण्याकरिता, लिक्विड - २ मिली/लीटर









निम्बीसीडीन (अॅन्जेडीरेक्टिन)




● निम्बीसीडीन हे निम्ब तेलावर आधारित असे वनस्पतीजन्य किटकनाशक आहे. ● निम्बीसीडीनमध्ये अॅन्जेडीरेक्टिन ३०० पीपीएम, १५०० पीपीएम, १०,००० पीपीएम, ५०००० पीपीएम असे प्रकार येतात. ● निम्बीसीडीनमध्ये अॅन्जेडीरेक्टिन व्यतिरिक्त, निम्बीन, निम्बीलीन, सालानीन, गेडूनिन, सालानोल इ. क्रियाशील घटक आहेत. ● निम्बीसीडीन किडीच्या चारी अवस्थामध्ये अंडी, अळी, कोश, पाकोळीमध्ये हल्ला करून किडीचे प्रभावी नियंत्रण करते. किडीची वाढ होऊ देत नाही तसेच किडींना वांडा बनविते. ● उष्ण वातावरणे किडी जवळ येत नाहीत. तसेच घातलेली अंडी नाश करते.

प्रमाण : ३०० पीपीएम - २.५ मिली/लीटर, १५०० पीपीएम - २ मिली/लीटर, १०००० पीपीएम - १ मिली/लीटर, ५०००० पीपीएम - ०.५ मिली/लीटर

वापरण्याची पद्धत - औषधात पाणी टाकून द्रावण तयार करणे.

वापरण्याची पद्धत



WATER

✓



NIMBECIDINE

✗




WATER

✓

१७



बायोनिमेटॉन (पॅसीलोमायसीस)



- बायोनिमेटॉनमधील बुरशी पॅसीलोमायसीस लिलॅसीनस ही सूत्रकृमीच्या संपर्कात येताच (अंडी, कोष, अळी) त्यांचे बीजाणू अंकुरतात आणि त्यांना पॅरालिसीसचा अँटक येऊन त्यांचा मृत्यू होतो. ● सूत्रकृमीमुळे मध्यम आकाराच्या गाठी तयार होऊन मुळाच्या अन्नद्रव्य शोषून घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणतात. ● सूत्रकृमीच्या प्रामुख्याने डाळींब, संत्रा, द्राक्ष, बोर, टोमॅटो, वांगी, भाजीपाला इ. पिकांवर आढळून येतो.

प्रमाण : जमिनीतून : २ लीटर/एकर



बायोकॅच (व्हर्टीसीलीयम)



- बायोकॅचमध्ये व्हर्टीसीलीयम लेकॅनी बुरशी असून ती रस शोषणाच्या किडीच्या संपर्कात येताच त्यांचे बीजाणू अंकुरतात व कीटकांच्या शरीरात प्रवेश करून आतील जीवनरसावर वाढतात. त्यामुळे किडीच्या चयापचायातील संप्रेरके नष्ट होतात. ज्यामुळे किडीला अपंगत्व येऊन किडीचा मृत्यू होतो.
- बायोकॅच रस शोषणाच्या किडी, मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी, फूल किडे, मिलीबग यांच्या नियंत्रणास वापरण्यास योग्य आहे.

प्रमाण : फवारणी : ५ मिली/लीटर
जमिनीतून : १ लीटर/एकर

बायोपॉवर (बीवरीया)



- बायोपॉवर मधील बुरशी बीवरीया बसीयाना किडीच्या संपर्कात येताच त्याचे बिजाणू अंकुरतात व कीटकाच्या शरीरात प्रवेश करून आतील जीवनरसावर वाढतात त्यामुळे चयापचयातील संप्रेरके नष्ट होतात त्यामुळे कीडींना अपंगात्व येऊन त्यांचा मृत्यू होतो. ● बायोपावर हे कठीण कवच असलेल्या किडीवर अत्यंत प्रभावी नियंत्रण करते. बोंडअळी, शेंडअळी, उडद्या, हिरवी अळी, फळ पोखरणारी अळी, हुमणी इत्यादी


प्रमाण : फवारणी : ५ मिली / लीटर
जमिनीतून : १ लीटर / एकर

बायोमॅजिक (मेटॅरायझीयम)



- बायोमॅजिकमधील बुरशी मेटॅरायझीयम अॅनीसोप्सी किडीच्या संपर्कात येताच त्यांचे बिजाणू अंकुरतात व कीटकांच्या शरीरात प्रवेश करून आतील जीवन रसावर वाढतात. त्यामुळे चयापचयातील संप्रेरके नष्ट होतात. त्यामुळे किडींना अपंगात्व येऊन त्यांचा मृत्यू होतो. ● बायोमॅजिक हे वाळवी, हुमणी, खोडकिडी, मितीबग, पांढरी माशी, इत्यादी करिता अत्यंत प्रभावी नियंत्रण करते.

प्रमाण : फवारणी : ५ मिली / लीटर
जमिनीतून : १ लीटर / एकर



रोग व्यवस्थापन





बॅक्टीमायसीन (ब्रोनोपोल)




● बॅक्टीमायसीन मधील घटक ब्रोनोपोल (डायब्रोमो-डायनाट्रो, १-३ डायॉल) असून हे बहुउपयोगी आंतरप्रवाही अनुजीवाणूजन्य रोगनाशक आहे. ते पिकांमधील अनुजीवजन्य रोगापासून पिकांचे संरक्षण होण्यास मदत करते. ● बॅक्टीमायसीन हे लिफ ब्लाईट, झान्तोमोनास, फळावरील डाग, करपा, ब्लॅकआर्म इ. रोगावर काम करते. ● बॅक्टीमायसीन हे प्रतिबंधक म्हणून फवारल्यास फारच प्रभावी आहे तसेच रोग आल्यास फवारल्यास रोगांचे नियंत्रण करते.

प्रमाण : २५ ग्रॅम / ५० लीटर पाण्याकरिता
१०० ग्रॅम / २०० लीटर पाण्याकरिता

२३

बायोक्वुअर एफ़ (ट्रायकोडर्मा)



● बायोक्वुअर एफ़ मध्ये ट्रायकोडर्मा विरीडी, ट्रायकोडर्मा हारझीनियम आणि ट्रायकोडर्मा हॅमटम या बुरशी असून या मर, मूळकूज, खोडकूज, फळकूज रोग नियंत्रण करण्याकरिता उपयोग होतो. ● बायोक्वुअर एफ़ मधील बुरशी हानीकारक बुरशी (फायटोफ्थोरा, पिथियम, फ्युजेरीयम, स्केलेरेशीयम व रायझोक्टोनिया तंतूभोवती गुंडाळले जातात व त्यातील अन्नद्रव्ये शोषून घेतात. परिणामी हानीकारक बुरशी मरतात. बायोक्वुअर एफ़ मधील बुरशी काही प्रकारची एनझाईम निर्मिती करतात. जी हानीकारक बुरशींना प्रतिबंध करतात.

प्रमाण : फवारणी : ५ मिली/ग्रॅम/लीटर,
बियाणे : १० मिली /ग्रॅम प्रति किलो,
जमीनीतून - २ लीटर/एकर

बायोड्युकॉन (अॅम्पीलोमायसीस)



● बायोड्युकॉनमध्ये अॅम्पीलोमायसीस, क्युसकॉलीस ही बुरशी असून, भुरी रोगाच्या बुरशीवर जगून त्यातील अन्नद्रव्ये शोषून घेते. परिणामी बुरशी मरण पावतात. ही बुरशी विशिष्ट प्रकारची मॅटॅबोलाईट साठवण करतात. जी हानीकारक बुरशीला अँटिबायोटिक म्हणून काम करतात. बायोड्युकॉन भुरी रोग येण्याआगोदर तसेच आल्यानंतर नियंत्रण मिळवते. बायोड्युकॉन हे ट्राक्ष, डाळिंब, भेंडी, टोमॅटो, गुलाब यावर येणाऱ्या भुरीवर उपयुक्त आहे.

प्रमाण : फवारणी : ५ ग्रॅम किंवा मिली/लीटर

अधिक परिणामाकरिता : १० ते १५ दिवसात कमीत कमी दोन ते तीन फवारणी करणे आवश्यक.



बायोक्वुअर बी (सुडोमोनास)



● स्टेन्स बायोक्वुअर बी मध्ये सुडोमोनास फ्लोरसेन्स सूक्ष्म जिवणू असून हे एक उत्तम जैविक बुरशीनाशक तसेच पिकवाढ संवर्धक आहे. ● बायोक्वुअर बी हे अणुजीवजन्य रोग, मर, मूळकुज, करपा, झान्तोमोनास, फळ व पानावरील काळे डाग यावर उपयुक्त आहे. ● बायोक्वुअर बी हानीकारक बुरशीच्या संपर्कात येतात त्याची वाढ झपाट्याने होऊन त्यांच्याभोवती गुंडाळले जातात व त्यातील अन्नद्रव्ये शोषून घेतात परिणामी हानीकारक बुरशी मरतात.

प्रमाण : फवारणी : ५ मिली / लीटर,
बियाण्याकरिता : १० मिली/किलो
जमिनीतून : २ लीटर/एकर



बायोस्टिंग (बॅसिलस)



● बायोस्टिंगमध्ये बॅसिलस सबटिलिस हे सूक्ष्म जिवणू असून ते एक अत्यंत प्रभावी बुरशीनाशक आहे. ● बायोस्टिंग अणुजीवजन्य रोग, मर, मूळकुज पानावरील करपा, झांथोमोनास, फळ व पानांवरील काळे डाग यावर चांगले प्रभावी बुरशीनाशक आहे. ● बायोस्टिंग हानीकारक बुरशीच्या संपर्कात येताच त्यांची वाढ झपाट्याने होऊन त्यांच्याभोवती गुंडाळले जातात व त्यातील अन्नद्रव्ये शोषून घेतात. परिणामी हानीकारक बुरशी मरतात. बायोस्टिंगच्या वापरामुळे पिकांमध्ये वाढ संवर्धक एन्झाईम्स तयार होण्यास मदत होते.

प्रमाण : फवारणी : ५ मिली/लीटर,
जमिनीतून - २ लीटर/एकर



कॉनब्लॉइट (चिटोमीयम)



- कॉनब्लॉइटमध्ये चिटोमीयम ग्लोबोसम ही जैविक बुरशी असून पायटोपथोरा बुरशीपासून होणारे ब्लॉइट रोग यावर नियंत्रण मिळवते.
- कॉनब्लॉइट पायटोपथोरा बुरशीपेक्षा लवकर वाढते आणि बुरशीच्या मुळांला जाण्याअगोदर त्यांना मारून टाकते.
- कॉनब्लॉइट हानीकारक बुरशीचे अन्नद्रव्य शोषून घेतात परिणामी बुरशी मरण पावतात.
- कॉनब्लॉइट टोमॅटो, बटाटा पिकावर येणारे ब्लॉइट रोगावर अत्यंत प्रभावी आहे.

प्रमाण : फवारणी : ५ मिली/लीटर,
झीपमध्ये : २ लीटर/एकर



क्युरेक्स



- क्युरेक्स हे वनस्पतीच्या अर्कापासून बनविलेले असून हे पिकावर येणाऱ्या व्हायरस रोगाकरिता प्रभावी उत्पादन आहे.
- क्युरेक्स पिकामध्ये रोग प्रतिकारशक्ती तयार होण्यास मदत करते.
- क्युरेक्स भेंडी, बटाटा, तंबाखू, मिरची, सोयाबीन, टोमॅटो इ. पिकावर येणाऱ्या विषाणूजन्य रोगास प्रतिबंध करते.
- क्युरेक्स प्रतिबंध फवारणी १० दिवसाच्या अंतराने ३ वेळा करावी.

प्रमाण : ४ मिली/लीटर

पाणी व्यवस्थापन



व्हॅम प्लस

(मायकोरायझा) दाणेदार



ग्रोकेअर

(मायकोरायझा) वॉटर सोल्युबल



१,००,००० पेशी
प्रति १०० ग्रॅम

- सिम्बीयॉन व्हॅमप्लस / ग्रोकेअर मध्ये व्हॅसीकुलर अरबूसक्युलर मायकोरायझा बुरशी असून हे वनस्पतीच्या मुळांमध्ये सहयोगी जीवन जगत असतात. ● मायकोरायझा हे मुळांच्या आत तसेच बाहेर राहून मुळांतील अन्नद्रव्य कार्बोहायड्रेट्स, अॅमिनोअॅसिड व्हिटॅमीन शोषून घेतात. त्याबदल्यात ते मुळांना फॉस्फरस, झिंक, पाणी इ. वाहून नेऊन देण्याचे काम करतात. ● जमिनीतील हानीकारक बुरशी, निमॅटोड, पाण्याचा ताण यांना प्रतिबंध करते. ● सिम्बीयॉन व्हॅममुळे/ग्रोकेअरमुळे मुळांची वाढ होण्यास मदत होते.

व्हॅम प्लस प्रमाण : भाजीपाला : ५ किलो /एकर,
डाळींब/द्राक्ष : १० किलो/एकर

ग्रोकेअर प्रमाण :
२५० ग्रॅम प्रति एकर




उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा या तीनही ऋतूत पिकाचे संरक्षण करणारे एकमेव उत्पादन ग्रीन मिरॅकल



तीन प्रमुख कार्य

- प्रकाश परावर्तन
- पर्णरंध्रे नियंत्रण
- चयापचय व कार्बोदकाचे नियमन



- ग्रीन मिरॅकलमध्ये अॅमोनो अॅसिड्स, पेप्टाईड, ओलीगोपेप्टाईड्स, हर्बल बेस फॅटी अल्कोहोल व उत्प्रेरके यांचे मिश्रण आहे. ● ग्रीन मिरॅकल वातावरणातील बदलामुळे पिकावर येणार ताण (थंडी, ऊन, पाऊस) कमी करण्याचे काम करते. ● ग्रीनमिरॅकल वापरामुळे बाष्पीभवनाचा वेग कमी करून पाण्याची बचत होण्यास मदत करते. ● ग्रीन मिरॅकल पानाचे आकारमान व प्रकाश संश्लेषणाचा वेग वाढवून उत्पादन वाढण्यास मदत करते. ● ग्रीन मिरॅकलमुळे फुलांची संख्या वाढविण्यास मदत करते, फुलगळ होऊ देत नाही. ● फळांची, फुलांची साठवणूक क्षमता वाढवते. ● पिकांचे थंडीपासून संरक्षण करते. ● ग्रीन मिरॅकल जिबरेलीक अॅसिड, सायटोकायनीन घटक वाढविण्यास मदत करते.

प्रमाण : ३ मिली/लीटर

सर्व पिकांस वापरण्यास उपयुक्त 'ग्रीन मिरॅकल' १०० % नैसर्गिक



(राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे प्रमाणित)

Treatment Details -

T1 = Green Miracle @ 2 ml/lit

T2 = Green Miracle @ 4 ml/lit

T3 = Green Miracle @ 6 ml/lit

T4 = Water spray alone

T5 = No Green Miracle & water application

Time of application : 40, 60, 100, 120 days after pruning and 5 days prior to harvest

Method of application : Spray

Number of application : 5

Number of plants per replication : 5

Number of replication : 4

Table 1. Effect of Green Miracle on berry quality

Treatment	Mean bunch wt.	100-berry wt.	Pedicle thickness	Berry diameter	Berry length	TSS	Acidity	Pulp Content	Yield/Plant
	(g)	(g)	(mm)	(mm)	(mm)	(°Brix)	(%)	(%)	(Kg)
T1	197.675	244.700	1.450	16.225	19.231	19.700	0.595	24.096	7.430
T2	223.250	241.850	1.588	15.725	18.456	20.250	0.615	22.453	8.237
T3	183.038	218.200	1.423	15.325	18.306	20.550	0.548	23.543	5.685
T4	130.675	188.575	1.375	13.950	16.538	19.700	0.543	22.647	4.907
T5	75.188	171.600	1.303	13.900	16.400	19.500	0.545	22.006	2.888
SEM ±	19.8	9.99	0.07	0.52	0.53	0.47	0.03	0.75	1.31
CD at 5%	43.1	21.7	NS	1.15	1.16	NS	NS	NS	2.87